

服用に際しこの説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要なおきに読みになれるよう大切に保存しておいて下さい。


整腸・軟便・便秘の方に

# フェカルミンスリーE顆粒 フェカルミンスリーE顆粒「分包」

納豆菌・乳酸菌・酪酸菌配合

## 特長

腸内細菌叢のバランスが崩れると、おなかにガスがたまる、軟便・下痢をくりかえすなどの便通異常を起こしやすくなります。フェカルミンスリーE顆粒は、一番便の滞留しやすい大腸下部に働く酪酸菌、小腸に働く納豆菌及び小腸下部から大腸上部に働く乳酸菌が配合されており、腸内での善玉菌の増殖と悪玉菌の抑制により、腸内細菌叢の崩れたバランスを整え、整腸を促し、腹部膨満感、軟便、便秘の改善に役立ちます。



## こんな方におすすめ!!

①



オナカにガスが  
たまりやすい

②



便通異常  
の方

③



いつも便秘と  
軟便をくりかえす

④



ビールなど  
冷たい飲物で  
軟便になりやすい

## ⚠️ 使用上の注意



### 【相談すること】




- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
\* (2) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人。
- 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。


**【効能・効果】**

整腸（便秘を整える）、腹部膨満感、軟便、便秘

**【用法・用量】**

次の1回量を1日3回食後に服用します。

年 齢	1回量	
	フェカルミンスリーE顆粒	フェカルミンスリーE顆粒「分包」
15才以上	1.2g（スプーン1杯） 	1包（1.2g）
8才以上15才未満	0.6g（スプーン1/2杯） 	1/2包（0.6g）
3ヶ月以上8才未満	0.3g（スプーン1/4杯） 	1/4包（0.3g）
3ヶ月未満	服用しないこと	服用しないこと



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】**

15才以上の1日量3.6g（3包）中

成 分	3.6g中	働 き
納豆菌末	50mg	納豆菌は、胃酸にも負けない、有芽胞菌と呼ばれる耐酸性のある菌で、腸内のビフィズス菌をはじめとする有用菌を増やす役目をする有用菌として、主に小腸で作用します。
乳酸菌末	100mg	乳酸菌は、本品に含まれる酪酸菌（有芽胞菌）と納豆菌（有芽胞菌）と協力して腸内の有害菌を抑制し、有用菌の増殖に役立ちます。
酪酸菌末	200mg	酪酸菌は、土壌や糞みその中でも存在する有芽胞菌で、便秘などで一番便の滞留しやすい直腸やS字結腸などの大腸下部で増殖し、整腸作用を発揮する大切な有用菌です。
〈添加物〉 乳糖、バレイショデンプン、白糖、デキストリン、バニリン		

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。（ピン入りの場合は密栓して保管してください。）
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 分包の場合、1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

**【包装】**

200g、48包、90包

**【お客様窓口】**

株式会社エバース・ジャパン

電話：045-473-2391

受付時間：午前9:30～午後5:30（土・日・祝日を除く）

開封日
年 月 日

発売元

 株式会社エバース・ジャパン  
神奈川県横浜市港北区新横浜2 - 14 - 26

製造販売元



日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3